

Content:

Bottle with 100 mL.

Indication:

Suitable for disinfection of cavitary preparations, crown preparations, inlays, antiseptics of professional's and assistant's hands, for extra-oral antiseptics in areas that will go through a surgical intervention, surfaces and equipment.

Description of the Product:

The CLORHEXIDINE SOLUTION 2% is an antiseptic with antibacterial activity which is effective against both gram-positive and gram-negative bacteria (including Pseudomonas), fungi, yeast and some dermatophylus.

How to use:**Cavities:**

1. With help of a piece of cotton, brush or micro applier, clean the indicated area. 2. Remove the excess and dry the cavity with air jet.

Surfaces:

Use the "spray-wipe-spray" technique.

Instruments:

1. With a piece of cotton soaked in the solution, clean the instrument carefully. 2. Then, dry it with the air jet. If necessary, dip it into the solution for minute and dry it again.

Precautions:

Product of professional use only; Avoid ingesting the product; Avoid contact of the product with the tongue or oral region; Do not use the product for rinsing the mouth, for in this concentration it might cause extrinsic tooth patch, tongue and restoration stains, burning mouth and taste alterations, although it is a reversible process when ceasing the treatment; Do not use the product if its shelf life is expired. Do not use it in patients with sensitivity to Clorhexidine.

Composition:

Chlorhexidine digluconate 2%, metilparabene, purified water.

Storage and transportation conditions:

Store in a clean, dry place, protected from direct sunlight and at a minimum temperature of 5 °C and maximum of 40 °C.

Validity:

24 months.

maquira

Clorhexidina Solução

Simbologia | Symbology | Simbología

	Consultar as informações de segurança, perigos e precauções. Consultar las informaciones de seguridad, peligros y precauciones. Consult the safety, danger and precautions information.		
	Mantener seco. Mantener seco. Keep dry.		Ler as instruções de uso. Leer las instrucciones de uso. Read the instructions of use.
	Mantener ao abrigo do sol. Mantener al abrigo del sol. Keep sheltered from sunlight.		Limites de temperatura. Limites de temperatura. Temperature limit.



MADE IN BRAZIL

maquira[®]
Dental Group**Fabricante | Manufacturer:**

Maquira Indústria de Produtos
Odontológicos S.A.

CNPJ: 05.823.205/0001-90

Endereço | Dirección | Address:

Av. Melvin Jones, 773
Pq. Ind. Bandeirantes
Maringá - PR | 87070-030 | Brasil

Resp. Técnico | Technical Resp.:

Cristiane Furlan | CRF-PR: 14.038

Reg. ANVISA N°: 80322400102

**SAP:**

Atendimento ao cliente
Atención al cliente
Customer service
0800 726 5848
sap@maquira.com.br

0403001 - rev.05

Conteúdo:

Frasco com 100 mL.

Indicação:

Indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas, inlays, antissepsia das mãos do profissional, do pessoal auxiliar, na antisepsia extra oral prévia em áreas que sofrerão intervenção cirúrgica, das superfícies e instrumentos.

Descrição do Produto:

A SOLUÇÃO DE CLORHEXIDINA A 2% é um antisséptico com atividade antibacteriana com eficácia para gram-positivas e gram-negativas (inclusive Pseudomonas), fungos, leveduras e alguns dermatófilos.

Modo de uso:**Cavidades:**

1. Com auxílio de um algodão, pincel ou micro-aplicador, limpar o local indicado. **2.** Remova o excesso e seque a cavidade com jato de ar.

Superfícies:

Utilizar a técnica "spray-wipe-spray".

Instrumentos:

1. Com um algodão embebido na solução, limpe cuidadosamente o instrumento. **2.** Após, seque com o jato de ar, e se necessário mergulhe o instrumento na solução por 1 minuto e seque novamente.

Precauções:

Produto de uso exclusivamente profissional; Evite a ingestão do produto; Evite o contato do produto com a língua e região da boca; Não utilizar para bochechos, pois nesta concentração poderá causar manchamento extrínseco dos dentes, da língua e das restaurações, ardência bucal e alterações no paladar, sendo um processo reversível com a suspensão do tratamento; Não utilizar o produto com prazo de validade vencido; Não usar em pacientes que apresentam sensibilidade conhecida à Clorhexidina.

Composição:

Digluconato de Clorhexidina 2%, metilparabeno, água purificada.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Armazenar em local limpo, seco, protegido da luz direta do sol e temperatura mínima de 5 °C e máxima de 40 °C.

Validade:

24 meses.

Contenido:

Frasco con 100 mL.

Indicación:

Indicado para desinfeción de preparaciones cavitarios, preparaciones en coroas, inlays, antiseptia de las manos del profesional, del personal auxiliar, en la antiseptia extra-oral prévia en áreas que sufrirán intervención quirúrgica, de las superficies e instrumentos.

Descripción del Producto:

LA SOLUCIÓN DE CLORHEXIDINA A 2% es un antiséptico con actividad antibacteriana con eficacia para gram positivas y gram negativas (inclusive Pseudomonas), hongos, levaduras y algunos dermatófilos.

Modo de uso:**Cavidades:**

1. Con auxilio de un algodón, pincel o microaplicador, limpie el local indicado. **2.** Retire el exceso y seque la cavidad con el chorro de aire.

Superfícies:

Utilice la técnica "spray-wipe-spray".

Instrumentos:

1. Con un algodón embebido en la solución, limpie cuidadosamente el instrumento. **2.** Después, seque con el chorro de aire, y si necesario sumerja el instrumento en la solución por 1 minuto y seque nuevamente.

Precauciones:

Producto de uso exclusivamente profesional; Evite la ingestión del producto; Evite el contacto del producto con la lengua y regiones de la boca; No utilice para enjuagues, pues en esta concentración podrá causar manchas extrínsecas de los dientes, de la lengua y de las restauraciones, ardor bucal y alteraciones en el paladar, siendo un proceso reversible con la suspensión del tratamiento; No utilice el producto con plazo de validez expirado; No use en pacientes que presentan sensibilidad conocida a la Clorhexidina.

Composición:

Digluconato de Clorhexidina 2%, metilparabeno, agua purificada.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte:

Almacenar en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar directa y a una temperatura mínima de 5 °C y máxima de 40 °C.

Validez:

24 meses.